

Angiospermae- krytosemenné

Magnoliopsida (Dicotyledonae)

Salicaceae

Populus

- P. alba* [stř. a s. Evr.—>s. Afr.—>M. Asie]: ‘Pyramidalis’
- P. ×canescens* (*P. alba* × *tremula*) [spont. Evr.—>M. Asie]
- P. tremula* [Evr.—>Sibiř, s. Afrika]
- P. tremuloides* [Sev. Amer.]
- P. simonii* [s. Čína]: ‘Fastigiata’
- P. lasiocarpa* [Čína] - listy až 30 cm dl.!
- P. trichocarpa* [pacifická Sev. Amer.] - listy až 25 cm dl.!
- P. ×canadensis* (*P. deltoides* × *nigra*) [spont. i v kultuře ve Francii 1750]
- P. nigra* [s. Afr.—>stř. Evr.—>Sibiř]: ‘Italica’

Salix

- S. alba* [Evr., z. a s. Asie]: (var. *vitellina*) ‘Tristis’
- S. daphnoides* [Evr.—>Himálaj]
- S. fragilis* [Evr.—>Orient]
- S. ×rubens* (*S. alba* × *fragilis*) [spont. ve stř. Evr.]
- S. ×alopecuroides* (= *S. speciosa*, *S. fragilis* × *triandra*) [hl. Rakousko, Morava, v kultuře od r. 1821] (pouze samčí klon)
- S. triandra* [Evr.—>Jap.]
- S. pentandra* [Evr.—>Kavkaz]
- S. babylonica* var. *pekinensis* [s. Čína—>Mandž.—>Korea]: ‘Tortuosa’ (= *S. matsudana* ‘Tortuosa’)
- S. ×sepulcralis* (*S. alba* ‘Tristis’ × *babylonica*) [kult., už před r. 1864]
- S. ×erythroflexuosa* (*S. ×sepulcralis* × *babylonica* var. *pekinensis* ‘Tortuosa’) [jen v kultuře, vyšlechtěna v Argentině v r. 1961]
- S. caprea* [Evr.—>sv. Asie]: ‘Kilmarnock’ (= ‘Pendula’)
- S. aurita* [Evr.—>Asie po Altaj]
- S. cinerea* [Evr.—>Kamčatka]
- S. viminalis* [Evr.—>Himálaj]
- S. purpurea* [Evr.—>s. Afr.]: ‘Gracilis’, ‘Pendula’
- S. elaeagnos* [stř. a j. Evr.—>M. Asie]: ‘Angustifolia’ (= ‘Rosmarinifolia’)
- S. ×simulatrix* (*S. formosa* [hory Evr. a Sibiře, Kavkaz] × *herbacea* [hory stř. Evr., s. Evr., Aljaška, Kanada, Grónsko]) [Švýcarsko, spontánní hybrid] (jen samčí klon)

Myricaceae

Comptonia

C. asplenifolia [Sev. Amer.]

Juglandaceae

Platycarya

P. strobilacea [Čína]

Pterocarya

P. fraxinifolia [Kavkaz—s. Írán]

Juglans

J. regia [v. Evr.—s. Asie]

J. nigra [v. část Sev. Amer.]

J. cinerea [v. část Sev. Amer.]

J. mandschurica [Mandžusko, Amurská obl.]

Carya

C. cordiformis [Sev. Amer., v močálech] („Bitternut Hickory“)

C. tomentosa (= *C. alba*) [v. USA] („Mockernut“) - dřevo!

C. ovata [v. USA] („Shagbark Hickory“)

C. glabra (= *C. porcina*) [v. USA] („Pignut“)

Betulaceae (s. l.)

Betula

B. lenta [v. část Sev. Amer.]

B. lutea (= *B. alleghaniensis*) [v. část Sev. Amer.]

B. nigra [v. USA, bažiny]

B. ermanii [Sachalin, Kamčatka, Jap., Korea]

B. pendula (= *B. verrucosa*, *B. alba*) [Evr.—Sibiř]: ‘Dalecarlica’, ‘Fastigiata’, ‘Youngii’

B. papyrifera [Sev. Amer.] - zářivě bílé kmeny

B. pubescens (= *B. odorata*) [stř. Evr.—Sibiř]

B. carpatica [pohoří stř. Evr.]

B. humilis [Evr.—Altaj]

B. nana [s. Evr., Sev. Amer.]

Alnus

A. viridis (= *Duschekia viridis*, *D. alnobetula*) [hory stř. Evr.]

A. suaveolens (= *A. viridis* subsp. *suaveolens*) [Korsika]

A. glutinosa [Evr.—Kavkaz—Sibiř]: ‘Laciniata’, ‘Quercifolia’

A. incana [Evr.—Kavkaz]: ‘Aurea’, ‘Laciniata’

A. cordata [Itálie, Korsika]

Carpinus

C. betulus [Evr.—Írán]: ‘Fastigiata’

C. orientalis [jv. Evr.—M. Asie]

Ostrya

O. carpinifolia [j. Evr.—M. Asie]

Corylus

C. colurna [jv. Evr.—>M. Asie]
C. avellana [Evr.]: ‘Contorta’, ‘Heterophylla’
C. maxima [jv. Evr.—>M. Asie]: ‘Purpurea’

Fagaceae

Fagus

F. sylvatica [stř. Evr.—>Kavkaz]: ‘Asplenifolia’, ‘Laciniata’
(= ‘Heterophylla’), ‘Pendula’, ‘Quercifolia’, ‘Rohanii’, ‘Zlatia’ (žluté listy zjara), ‘Atropunicea’, ‘Purpurea Pendula’, ‘Purpurea Tricolor’ (= ‘Roseomarginata’), ‘Fastigiata’, ‘Cristata’

Castanea

C. sativa [M. Asie—>j. Evr.—>s. Afr.]

Quercus

Q. rubra [Sev. Amer.: Nova Scotia—>Georgia]
Q. coccinea [v. USA - vlhko!]
Q. palustris [v. USA]
Q. ilex [Medit.] - jen sbírkový druh!
Q. libani [Sýrie, M. Asie]
Q. pontica [Kavkaz]
Q. macranthera [Kavkaz—>s. Írán]
Q. macrocarpa [atlant. Kanada a USA] - listy až 30 cm dl.!
Q. frainetto (= *Q. conferta*, *Q. hungarica*) [Balkán, Turecko, Itálie, Maďarsko]
Q. ×turneri (*Q. ilex* × *robur*?) [v Anglii v kultuře]: ‘Pseudoturneri’
Q. cerris [j. Evr.—>M. Asie]: ‘Ambrozyana’, ‘Laciniata’ (juvenil. forma)
Q. pubescens (incl. *Q. virgiliana*) [j. Evr.—>M. Asie]
Q. pyrenaica [Pyreneje, j. Francie]
Q. petraea (incl. *Q. dalechampii* et *Q. polycarpa*) [Evr.—>M. Asie]: ‘Mespilifolia’, ‘Cochleata’, ‘Columna’
Q. robur [Evr.—>M. Asie] (incl. *Q. pedunculiflora* [Balkán—>Zakavkazsko]): ‘Concordia’ (žluté listy zjara), ‘Asplenifolia’, ‘Fastigiata’, ‘Cucullata’, ‘Pectinata’, ‘Atropurpurea’

Ulmaceae

Ulmus

U. laevis [stř. Evr.—>Kavkaz]
U. glabra (= *U. montana*) [Evr.—>M. Asie]: ‘Camperdownii’, ‘Pendula’
U. procera [Anglie—>stř. a j. Evr.]
U. ×hollandica (*U. glabra* × *minor*) [jen v kultuře]
U. minor (= *U. campestris*, *U. carpinifolia*) [Evr.]: ‘Wredei’
U. parvifolia [Čína, Korea, Jap.]

Zelkova

Z. carpinifolia [Kavkaz]
Z. serrata [Jap.]

Celtis

C. occidentalis [Sev. Amer.]

C. australis [j. Evr.—>s. Afr.—>z. Asie]

Moraceae

Morus

M. alba [Čína]: ‘Nana’, ‘Pendula’

M. nigra [Orient]

M. rubra [v. USA]

Maclura

M. pomifera (= *M. aurantiaca*) [Sev. Amer.: Arkansas—>Texas]

Broussonetia

B. papyrifera [Čína, Jap.]

Ficus

F. carica [M. Asie]

Aristolochiaceae

Aristolochia

A. durior (= *A. macrophylla*) [v. Asie]

Polygonaceae

Fallopia

F. aubertii [Čína]

Cercidiphyllaceae

Cercidiphyllum

C. japonicum [Jap.]