

Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha,
23: 48-50, 1988

Milan C h y t r ý

Krátký floristický příspěvek z okresu Blansko

A short floristic contribution from the district of Blansko
(Central Moravia)

V příspěvku podávám výčet nových lokalit regionálně významných druhů zjištěných na území okresu Blansko v letech 1984-1985. Vybírám pouze lokality, které dosud nebyly v regionální floristické literatuře publikovány a nejsou uvedeny ani ve floristicky zaměřených diplomových, resp. dizertačních pracích na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno. Většina lokalit je situována do nižších poloh v jižní části Malé Hané a v severním výběžku Řečkovicko-kuřimského prolomu s vyznívajícím semixerotermní vegetací.

Nomenklatura rostlinných taxonů je převzata z práce Smejkal (Smejkal 1980). Dokladový materiál je uložen v herbáři BRNM.

- Aster amellus* - Skalička: xerotermní trávník na mezi na jižním okraji lesa 0,7 km V od obce, 320 m n.m.
Carex flava - Boskovice-Vratíkov: vlhká louka na dně údolí 0,5 km J od obce, 430 m n.m.
Caulis platycarpus - Lažany: opuštěný vápencový lom na okraji lesa 1,3 km ZSZ od obce, 320 m n.m.
Centaureum erythraea - Velké Opatovice-Svárov: v trávníku při křižovatce lesních cest 1 km J od obce, 510 m n.m.; Šebrov: na pasekách JV od hájenky 1 km S od obce, 440 m n.m.
Cephalanthera damasonium - Skalička: xerotermní trávník na mezi na jižním okraji lesa 0,7 km V od obce, 320 m n.m.; Rájec-Jestřebí: okraj lesa na jižně exponovaných stráních nad potokem Býkovkou 1 km SZ od obce, 360 m n.m.
Chamaecytisus ratisbonensis - Rájec-Jestřebí: roztroušeně v komplexu jižně exponovaných strání nad silnicí Jestřebí-Bořitov, 360 m n.m.
Dactylorhiza majalis - Lysice: vlhká louka v jihozápadním výběžku lesa pod Malým chlumem 0,5 km JV od samoty Perná, 350 m n.m.
Dentaria enneaphyllos - Šebrov-Kateřina: v lese poblíž silnice do Blanska 1 km JV od Kateřiny, 280 m n.m.

- Dianthus armeria* - Šebrov: na západním okraji lesa 0,8 km S od obce, 400 m n.m.
- Dorycnium pentaphyllum* subsp. *germanicum* - Rájec-Jestřebí: na jižně exponovaných straních pod lomem v turonských slínevcích na severozápadním okraji Jestřebí, 340 m n.m.
- Epipactis palustris* - Lysice: vlhká louka v jihozápadním výběžku lesa pod Malým chlumem 0,5 km JV od samoty Perná, 350 m n.m.
- Eriophorum latifolium* - Boskovice-Vratíkov: vlhká louka na dně údolí 0,5 km J od obce, 430 m n.m.
- Gentianopsis ciliata* - Újezd u Černé Hory: meze na okrajích lesa 0,8 km S od obce, 370 m n.m.
- Hypericum tetrapterum* - Lysice: vlhká louka 0,5 km JV od samoty Perná na JZ výběžku lesa pod Malým chlumem, 350 m n.m.; Lipůvka: v rákosinách podél potoka Kuřimka 1 km JJV od obce, 340 m n.m.
- Iris pseudacorus* - Lipůvka: podél potoka Kuřimka 1 km JJV od obce, 340 m n.m.
- Kohlruschia prolifera* - Lažany: opuštěný vápencový lom na okraji lesa 1,3 km ZSZ od obce, 320 m n.m.
- Lathyrus sylvestris* subsp. *sylvestris* - Šebrov: podél lesní cesty 1,5 km S od obce, 460 m n.m.; Milonice-Závist: na pasece v lese 0,5 km JV od Závisti, 420 m n.m.; Rájec-Jestřebí: okraj lesa 1 km JZ od Jestřebí, 350 m n.m.; Bořitov: jižně exponované stráně 0,8 km JV od obce, 350 m n.m.
- Leopoldia comosa* - Kunětat: mez na jižním úbočí Mramorky, kóta 556 1 km SZ od obce, 520 m n.m.; Zbraslavec: mez u silnice do Drnovic 1 km JJV od obce, 380 m n.m.; Letovice-Zboněk: na mezi podél polní cesty 0,5 km VJV od obce, 380 m n.m.; Lipůvka: východně exponovaná strán na východním okraji obce, 380 m n.m.
- Listera ovata* - Doubravice n. Svit.: vlhké údolí lesního potoka 1,3 km Z od obce, 340 m n.m.
- Logfia arvensis* - Újezd u Boskovic: v lomu 1 km JZ od obce, 460 m n.m.
- Melampyrum arvense* - Zbraslavec: jihovýchodně exponované stráně pod lesem 0,2 km V od obce, 420 m n.m.; Bačov: jižně exponovaná stráně nad silnicí 0,7 km JV od obce, 370 m n.m.; Boskovice: jižně exponovaná stráně nad silnicí na úpatí Rovné (kóta 446) 2 km JZ od města, 360 m n.m.
- Orchis militaris* - Rájec-Jestřebí: hojně na jižně exponovaných terasovitých úhorech 0,8 km ZSZ od obce, 330 m n.m.
- O. morio* - Lipůvka: stráně na severovýchodním okraji obce, 400 m n.m.
- Platanthera bifolia* - Doubravice n. Svit.: okraj lesa 1,5 km ZSZ od obce, 370 m n.m.; Lažany: v lese 1 km ZSZ od obce, 350 m n.m.
- Prunella grandiflora* - Lysice: meze 0,2 km S od silnice do Stěchova 1 km od města, 430 m n.m.

- Rosa gallica* - Bačov: jižně exponované stráně nad silnicí
0,5 km VJV od obce, 380 m n.m.
- Scrophularia umbrosa* - Svinošice: okraj lesa v údolí potoka
0,8 km SV od obce, 390 m n.m.
- Thalictrum aquilegifolium* - Sloup: vlhké louky v široké nivě
potoka Luhy u "Vlčí skály" 3 km SSV od obce, 510 m n.m.
- Tretortiza cruciata* - Doubravice n. Svit.: na stráních při-
lehlých k opuštěnému pískovcovému lomu 1,5 km JJZ od obce
320 m n.m.
- Veronica prostrata* - Doubravice n. Svit.: na stráních při-
lehlých k opuštěnému pískovcovému lomu 1,5 km JJZ od obce,
320 m n.m.; Skalička: xerothermní trávník na jižním okraji
lesa 0,7 km V od obce, 320 m n.m.

Summary

The present paper deals with some new localities of regionally interesting species from the territory of the district of Blansko discovered during the author's observations in 1984-1985.

Literatura

Smejkal M. (1980): Komentovaný katalog moravské flóry. - 301 p., Brno.

Adresa autora:

Milan Chytrý, 679 22 Lipůvka 201